

NOUVEAUX COLÉOPTÈRES (2<sup>e</sup> NOTE) (1),

PAR M. M. PIC.

**Paralichas niger** n. sp.

*Oblongus, parum nitidus, griseo pubescens, niger; thorace dense punctato, medio postice impresso; elytris diverse striatis et ruguloso-punctatis.*

Oblong, peu brillant, pubescent de gris, unicolore, noir. Tête inclinée, rugueusement ponctuée, yeux grands, très saillants; antennes atteignant le milieu des élytres, simples, un peu épaisses, atténuées à l'extrémité; prothorax densément et rugueusement ponctué, court, très rétréci en avant, un peu infléchi sur sa partie antérieure, marqué d'une grande impression médiane postérieure, sinué sur la base; écusson grand; élytres de la longueur du prothorax à la base, un peu élargis vers le milieu et atténués postérieurement, diversement striés, sauf près de l'écusson, avec des stries internes complètes et plus fortes, des stries externes plus fines et, postérieurement surtout, ruguleusement ponctués; pattes peu épaisses, tarses longs et grêles. Longueur 9 millimètres.

Madagascar : Diégo-Suarez (ex coll. Fairmaire, au Muséum de Paris.

Genre nouveau pour l'Afrique et espèce bien caractérisée par sa coloration générale noire et la sculpture des élytres.

**Therius Perrieri** n. sp.

*Elongatus, nitidus, griseo pubescens et parum hirsutus, nigropiceus aut castaneus, antennis ad basin, labro, palpis pedibusque testaceis; elytris striatis.*

Allongé, brillant, à pubescence grise en partie redressée, noir de poix ou châtain avec les parties buccales, la base des antennes et les pattes testacés. Tête assez large avec les yeux gros et saillants, distinctement ponctuée; antennes filiformes, grêles, assez longues, foncées, à base testacée; prothorax court et large, un peu rétréci en avant, marginé sur les côtés, modérément ponctué; écusson

(1) 1<sup>re</sup> Note : *Bull. Mus.*, 2<sup>e</sup> s., III, 1931, p. 106.

*Bulletin du Muséum*, 2<sup>e</sup> s., t. III, n<sup>o</sup> 5, 1931.

grand; élytres un peu plus larges que le prothorax, longs, un peu atténués à l'extrémité, striés et assez fortement ponctués, tarsi grêles, avant-dernier article un peu appendiculé. Longueur 4 millimètres.

Madagascar (ex collection Perrier de la Bathie, au Muséum de Paris; aussi dans la collection Pic).

Ressemble à *T. nitidissimus* Pic, s'en distingue facilement par le prothorax moins transversal et les élytres striés.

**THERIUS PERRIERI** v. nov. **bicolor**.

*Rufus, membris pallidioribus et capite paulo brunnescente, elytris nigro-piceis, sutura rufa.* Longueur 4,5 millim.

Madagascar (Muséum de Paris).

Variété caractérisée par la taille un peu plus avantageuse et la coloration plus claire d'une partie du corps.

**ORA MULTINOTATA** (1) v. nov. **reducta**.

*Oblongo-subovata, testacea, capite thoraceque minute brunneo notalis, elytris ad medium et postice irregulariter et diverse piceo maculatis, maculis aliquot pro parte junctis.* Longueur 2,5 mill.

Madagascar (collections du Muséum de Paris et Pic).

Variété caractérisée par les dessins foncés plus réduits sur les élytres, non étendus sur la base et l'avant-corps plus clair.

**Scirtes Perrieri** n. sp.

*Oblongo-subovalus, nitidus, testaceus, capite postice brunnescente, elytris testaceis, signaturis brunneis notalis.*

Oblong-subovale, brillant, testacé, tête plus ou moins rembrunie en arrière, élytres ayant des dessins bruns. Tête et prothorax finement ponctués, la ponctuation des élytres à peine plus forte et rapprochée, ces derniers organes ayant une bande brune latérale irrégulière s'étendant de la base au delà du milieu, se joignant à une bordure basale également brune, qui se prolonge un peu sur la suture derrière l'écusson qu'elle entoure, en outre une macule allongée brune présuturale antéapicale; tibias postérieurs un peu courbés. Longueur : 2 millimètres environ.

Madagascar (in collection Perrier de la Bathie et Pic).

Voisin de *S. testaceonotatus* Pic, en diffère par le prothorax non marqué de foncé et la disposition toute autre des dessins des élytres.

(1) Décrit comme *Scirtes* III (L'Échange, XXIX, 1913, p. 172). La tête possède deux fovéoles qui caractérisent (selon Champion) le genre *Ora* Clark.

**Pseudocolotes convexus** n. sp.

*Oblongus, nitidus, valde convexus, niger, membris pro parte testaceis, elytris subglobosis.*

Oblong, brillant, très convexe, noir avec les membres en partie testacés. Tête de la largeur du prothorax, celui-ci convexe, non transversal, subarqué sur les côtés, plus étroit que les élytres; élytres subglobuleux, très convexes, à épaules nulles, à ponctuation assez forte, écartée. Longueur 1,5 millim. environ.

Madagascar (collection Perrier de la Bathie).

Cette petite espèce, voisine de *P. Decorsei* Pic, est très caractérisée par la forme subglobuleuse et très convexe des élytres.

**Hedybius Schimperi** n. sp.

*Elongatus, postice dilatatus, nitidus, griseo-pubescens et fusco-hirsulus, niger, elytris viridibus, thorace membrisque testaceis.*

Allongé, élargi postérieurement, brillant, pubescent de gris avec des poils foncés dressés sur le dessus du corps, noir, avec les élytres verts, le prothorax et les membres testacés, cuisses antérieures un peu foncées à la base. Tête simple, courte, de la largeur du prothorax; prothorax court, large, subarqué sur les côtés, un peu rétréci en arrière; élytres à peu près de la largeur du prothorax à la base, longs, élargis en arrière, un peu rétrécis à l'extrémité, inégalement ponctués, un peu déprimés en avant. Longueur 3 millimètres.

Abyssinie : Tigré (Schimper, in Museum de Paris).

Espèce caractérisée par sa forme étroite, plus allongée que d'ordinaire.

**Microjulistus olivaceus** n. sp.

*Elongatus, nitidus, griseo pubescens, nigro-olivaceus, membris testaceis.*

Allongé, brillant, orné d'une pubescence grise couchée, longue et espacée, noir olivâtre, membres testacés. Tête un peu allongée, parties buccales claires, prothorax assez court, élargi en arrière, à ponctuation assez forte, écartée; élytres à peu près de la largeur du prothorax, longs, atténués à l'extrémité, à ponctuation écartée, plus forte en avant; pattes grêles. Longueur 3 millimètres.

Abyssinie : Tigré (Schimper, in Museum Paris et coll. Pic).

Espèce distincte, à première vue, par sa coloration foncée, olivâtre.

**Xamerpus Sicardi** n. sp.

*Oblongo-subovalus, nitidus, griseo pubescens, longe fusco hirsutus, rufus, infra corpore antennisque apice nigris, elytris caeruleis, pro parte et minute rufo marginalis.*

Oblong, subovale, brillant, orné d'une pubescence grise et de longs poils dressés obscurs, d'un roux un peu rougeâtre avec le dessous et le sommet des antennes noirs, les élytres bleutés, avec une étroite bordure rousse externe, s'effaçant en arrière. Tête à ponctuation peu forte, écartée; prothorax court et large, arqué sur les côtés, un peu prolongé sur le milieu antérieur, à ponctuation un peu forte, écartée sur le milieu; écusson roux; élytres larges et assez courts, atténués à l'extrémité, un peu comprimés sur les côtés antérieurs, à faible dépression antérieure et ponctuation peu forte, écartée, calus huméral bien marqué. Longueur 4 millimètres.

Madagascar : Mont d'Ambre (Dr Sicard, in Muséum de Paris).

Voisin de *X. vageguttatus* Frm., en diffère, à première vue, par les élytres de forme plus trapue et marginés de roux.

**Cyrtosoma testaceicorne** n. sp.

*Minutum, antice et postice attenuatum, nitidum, rufum, capite antice antennisque pallidioribus, capite postice thoraceque olivaceis, elytris rufo-aeneis, fortiter striatis; thorace lateraliter simplice, alutaceo, minule et sparse punctato.*

Petit, atténué aux extrémités, davantage en arrière, brillant, glabre, roux avec le devant de la tête et les antennes plus claires, partie postérieure de la tête et prothorax olivâtre de poix, ceux-ci subinfacés, à ponctuation assez fine et éparse; élytres d'un roux bronzé, fortement striés avec les intervalles convexes, un peu ponctués, ces organes un peu rétrécis en avant, davantage à l'extrémité; antennes épaissies à l'extrémité; prothorax court et assez large, un peu rétréci en arrière, à côtés sans dent, angles antérieurs nuls, postérieurs presque droits; pattes peu robustes. Longueur 5 millimètres.

Amérique méridionale (collection Fairmaire).

Cette petite espèce est caractérisée par sa petite taille, son prothorax à côtés simples, ainsi que sa coloration. On peut la placer près de *C. coracinum* Geb.

\* \* \*

Les nouveautés qui suivent, originaires de Costa-Rica, ont été recueillies par M. Paul Serre.

**Attalus Serrei** n. sp.

*Oblongus, nitidus, niger, femoribus ad basin abdomineque rufis, thorace rufo, nigro vittato, elytris rufis, ad basin nigro fasciatis et postice nigro maculatis.*

Oblong, brillant, orné d'une pubescence grise ou obscurcie courte, en partie soulevée sur les élytres. Tête noire avec l'épistome blanc, assez large; antennes foncées, un peu teintées de roux en dessous des premiers articles, assez grêles, un peu plus longues que le prothorax; prothorax court, pas très large, subarqué sur les côtés, roux avec une bande noire médiane large en avant, amincie en arrière; élytres un peu plus larges que le prothorax, faiblement élargis postérieurement, peu longs, à ponctuation fine et écartée, roux avec une bande noire basale transversale et ayant, en outre, sur chaque élytre, une grande macule noire antéapicale un peu rétrécie en avant; dessous du corps foncé, abdomen roux; pattes noires avec l'extrême base des cuisses et hanches rousses, assez longues, tibias droits. Longueur 2,5 millim. environ.

Costa-Rica (P. Serre, au Muséum de Paris).

Cette espèce se rapproche de *A. maculosus* Gorb., en diffère, à première vue, par la tête foncée, le prothorax autrement marqué de noir, les élytres moins longs avec leur macule postérieure noire plus étendue.

**Silis Serrei** n. sp.

*Elongatum, nitidum, nigro-fuliginosum, capite antice, thorace, illo medio nigro vittato, pedibusque pro parte testaceis, elytris albo marginalis, articulis tribus ultimis antennarum flavis.*

Allongé, brillant, peu densément pubescent de gris avec quelques poils soulevés obscurs sur le dessus du corps. Tête courte, moins large que le prothorax, foncée en arrière, testacée en avant à partir du milieu des yeux; antennes pas très longues, grêles, noires avec les trois derniers articles flavés; prothorax testacé, à bande médiane foncée complète, élargie sur les bords antérieur et postérieur, court et large, sinué sur les côtés, muni, sur le milieu des côtés, d'une petite expansion surélevée, un peu échancré en dessous avec les angles postérieurs petits et saillants; écusson foncé; élytres un peu plus larges que le prothorax, allongés, subparallèle, inégalement ponctués ou finement granuleux, à côtes discales à peine marquées, d'un noir gris, bordées étroitement de blanc sur tout le pourtour, sauf à l'extrémité, épaules brièvement marquées de testacé; dessous du corps noir de poix; pattes grêles, antérieures foncées avec la base des cuisses testacée, intermédiaires testacées avec genoux, partie des tibias et des tarses foncés, postérieures

testacées avec partie des tarses foncée, ongles de structure diverse, en partie simples.

Longueur 5 millimètres.

Costa-Rica (P. Serre, au Muséum de Paris.)

Très voisin de *S. oblita* Gorh., en diffère, à première vue, par le prothorax plus transversal, à bande foncée médiane complète et élargie sur les bords et par les élytres bordés de pâle.

LUCIDOTA FULGURANS V. NOV. **subinterrupta.**

*Elongata, parum nitida, testacea, capite, antennis, tibiis tarsisque nigris, infra corpore pro parte piceo, abdomine apice flavo, elytris testaceis, ad scutellum minute et postice in disco longe nigro notatis, ad suturam antice parum distincte piceo-villatis; antennis valde compressis; thorace sat breve, antice medio paulo attenuato, testaceo, in disco ante basin late rubro, pro parte fortiter ruguloso-punctato; elytris subparallelis, postice paulo attenuatis, minute pro parte dense ruguloso-punctatis, in disco parum distincte costulatis.*

Longueur 10 millimètres.

Costa-Rica (P. Serre, au Muséum de Paris).

Diffère au moins de *L. fulgurans* Gorh., qui ne m'est connu que par la description, par le prothorax non marqué de noir et le dessin noir des élytres particulier, formant une bande noire longitudinale s'oblitérant en avant.